

# Identificatie

## 5-6mm *Kleine Kamervlieg*



*Fannia canicularis*

**Kenmerken**  
Bruine thorax met op het achterlijf (abdomen) 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

**Controle**  
PestWest lijmplank toestellen zijn effectief bij controle en bestrijding.

## 7-15mm *Gewone Steekmug*



*Culex* spp.

**Kenmerken**  
Slank, 0,6 cm. lang, met relatief lange poten. Achterrand en aders van de vleugels zijn vaak behaard. Achterlijf is geringd.

**Controle**  
Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 9-13mm *Blauwe Vleesvlieg*



*Calliphora* spp.

**Kenmerken**  
Heldere, metaalachtige glanzende kleuren (blauwzwart met donkerbruine tot rode ogen).

**Controle**  
Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 15-20mm *Wesp*



*Vespa* spp.

**Kenmerken**  
Karateristische gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, twee paar doorzichtige vleugels. Overgang van borststuk naar achterlijf sterk getailleerd.

**Controle**  
Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.

## 10mm *Klustervlieg*



*Pollenia rudis*

**Kenmerken**  
Ongeveer 8 mm. Langer dan kamervlieg, veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen is grijs.

**Controle**  
Ruimten waar de klustervlieg in groepen samenkomt behandelen met een residueel insecticide, vervolgens populatie controleren met Elektrische Vliegenvangers van PestWest.

## 3-4mm *Megaselia*



*Megaselia* spp.

**Kenmerken**  
Donker bruine thorax, opvallend gebogen voorkomen.

**Controle**  
Chameleon lijmplank toestellen en PestWest electrocutie toestellen zijn uitermate effectief.

## 5-6mm *Sciara thomae*



*Sciara thomae*

**Kenmerken**  
Klein insect met spanwijdte van 14-15mm. Zwarte kop, thorax en achterlijf. Thorax heeft gebogen vorm.

**Controle**  
Chameleon lijmplank toestellen zijn zeer effectief als controle middel.

## 1.2-1.5mm *Knijt*



*Culicoides* spp.

**Kenmerken**  
Donkerbruin tot zwart. Vleugelwijdte 3-4 mm. Zwermen in grote aantallen ronden.

**Controle**  
Gebruik repellents om steken te voorkomen. Chameleon lijmplank toestellen zijn effectief.

## 3mm *Fruitleg*



*Drosophila* spp.

**Kenmerken**  
Volwassen exemplaar is 0,3 tot 0,4 cm lang, helderrode ogen, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.

**Controle**  
PestWest lijmplank toestellen zijn effectief bij controle en bestrijding.

## 6-8mm *Kamervlieg*



*Musca domestica*

**Kenmerken**  
Volwassen kamervlieg is 0,7 tot 0,8 cm. lang, thorax grijs met zwarte strepen. Zijkanten van het achterlijf zijn geelachtig, een donkere band bedekt het onderste segment van het abdomen.

**Controle**  
Alle PestWest Elektrische Vliegenvangers zijn effectief.